

Przerost endometrium: objawy

Napisano dnia: 2022-12-07 17:42:51

MATERIAŁ PARTNERA



Przerost endometrium jest schorzeniem, które może wywołać szereg nieprzyjemnych, bardzo dokuczliwych objawów. Niestety diagnostyka tego problemu wciąż jest bardzo utrudniona, podobnie jak dobranie odpowiedniego sposobu leczenia. Jakie objawy mogą świadczyć o przeroście endometrium?

Dlaczego wykrycie przerostu endometrium jest takie ważne?

Wczesne wykrycie problemu daje duże szanse na zminimalizowanie objawów oraz znaczną poprawę komfortu życia kobiety. Dodatkowo niezatrzymanie przerośniętego endometrium może zwiększać ryzyko rozwoju raka szyjki lub trzonu macicy.

Lekarz może postawić diagnozę przerostu endometrium na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pacjentką, zgłaszanych przez nią objawów oraz podstawowych badań, takich jak USG przezpochwowe.

Przerost endometrium najczęściej diagnozowane jest u kobiet po 55 roku życia, jednak może wystąpić także u bardzo młodych osób.

Przerost endometrium: objawy

Podstawowym objawem, mogącym zaniepokoić i skłonić do wizyty u ginekologa, są zaburzenia miesiączek. Jeśli są one nieregularne, to znaczy długość cykli znacznie się między sobą różni, może to wskazywać na obecność przerośniętego endometrium.

Częstym symptomem są także obfite i przedłużające się krwawienia miesięczne, a także plamienia pomiędzy nimi. Wszelkie nieprawidłowości, które dla pacjentki nie są naturalne i nie występują co miesiąc, powinny być skonsultowane z ginekologiem.

W przypadku przerośniętego endometrium pacjentki mogą także odczuwać bóle podczas stosunku. U kobiet po menopauzie albo w czasie hormonalnej terapii zastępczej może dojść do krwawień z dróg rodnych, jeśli endometrium nieprawidłowo się rozrasta. Każde krwawienie po menopauzie powinno skłonić do wizyty u ginekologa.

W przypadku, kiedy przerost jest bardzo duży, mogą wystąpić dodatkowe dolegliwości bólowe - nie tylko w czasie krwawienia miesięcznego, ale także w środku cyklu.

W przebiegu przerostu endometrium mogą pojawić się także bóle podbrzusza (podobne jak przed lub w trakcie miesiączki), a także bóle jajników. Przerośnięte endometrium czasem pojawia się wraz z zespołem policystycznych jajników, który może być przyczyną nieprawidłowych rozrostów.

Bezobjawowy przerost endometrium

Niestety, bardzo często [przerośnięte endometrium](#) przez bardzo długi czas nie daje żadnych objawów. Jedyną opcją wykrycia problemów jest wykonanie badania USG, podczas którego specjalista zauważy pogrubione endometrium.

Dlatego tak ważne są regularne, kontrolne wizyty i ginekologa oraz wykonywanie profilaktycznych badań. Przynajmniej raz w roku warto zgłosić się nie tylko na USG dróg rodnych, ale także piersi oraz badania krwi.